

## **Příbalová informace: informace pro pacienta**

### **Mucoplant proti kašli s břečťanem sirup**

Léčivá látka: suchý extrakt z břečťanového listu

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je Mucoplant proti kašli s břečťanem a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s břečťanem užívat
3. Jak se Mucoplant proti kašli s břečťanem užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Mucoplant proti kašli s břečťanem uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### **1. Co je Mucoplant proti kašli s břečťanem a k čemu se používá**

Mucoplant proti kašli s břečťanem obsahuje suchý extrakt z břečťanového listu.

Mucoplant proti kašli s břečťanem je rostlinný léčivý přípravek používaný k usnadnění vykašlávání hlenu při vlhkém kašli u dospělých, dospívajících a dětí od 2 let věku.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Mucoplant proti kašli s břečťanem užívat**

##### **Neužívejte Mucoplant proti kašli s břečťanem**

- jestliže jste alergický(á) na listy břečťanu, na rostliny z čeledi aralkovité nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- u dětí do 2 let věku z důvodu rizika zhoršení dýchacích potíží při podávání léků, které zkapalňují hlen a usnadňují vykašlávání.

##### **Upozornění a opatření**

- V případě přetrvávajícího nebo vracejícího se kašle u dětí ve věku 2–4 let je před započatím léčby nutno stanovit diagnózu.
- V případě dýchacích obtíží, horečky, nebo hnisavého (hnis obsahujícího) hlenu, se máte poradit se svým lékařem nebo lékárníkem.
- Pokud se příznaky nezlepší do 7 dnů během užívání tohoto přípravku, máte navštívit svého lékaře.

- Nedoporučuje se užívat tento přípravek s dalšími léky, které potlačují kašel (opiátová antitusika, jako je kodein nebo dextromethorfan) bez porady s lékařem.
- Pokud máte žaludeční potíže (zánět žaludku, žaludeční vřed), je při užívání léku nutná opatrnost.
- Pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater, poraďte se před užíváním přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem se svým lékařem nebo lékárníkem. U těchto pacientů nebylo stanoveno doporučené dávkování.

### **Další léčivé přípravky a Mucoplant proti kašli s břečťanem**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není známo žádné vzájemné působení přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem s jinými léky. Nebyly provedeny žádné studie týkající se vzájemného působení s jinými léky.

### **Přípravek Mucoplant proti kašli s břečťanem s jídlem a pitím**

Mucoplant proti kašli s břečťanem lze užívat bez ohledu na jídlo.

### **Těhotenství, kojení a plodnost**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Mucoplant proti kašli s břečťanem se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení vzhledem k nedostatečným údajům o užívání suchého extraktu z břečťanového listu u těhotných žen a kojících matek.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinek na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Nebylo hlášeno, že by přípravek Mucoplant proti kašli s břečťanem ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje.

### **Mucoplant proti kašli s břečťanem obsahuje roztok maltitolu.**

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

10 ml sirupu obsahuje 4 g roztoku maltitolu, což odpovídá 0,3 chlebovým jednotkám. To je třeba vzít v úvahu, pokud trpíte cukrovkou. Energetická hodnota maltitolu je 2,3 kcal/g.

Roztok maltitolu může mít mírný projímavý účinek.

## **3. Jak se Mucoplant proti kašli s břečťanem užívá**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

- pro **dospělé a dospívající od 12 let věku:**  
15 ml třikrát denně.
- pro **děti od 6 do 11 let věku:**  
15 ml dvakrát denně.
- pro **děti od 2 do 5 let věku:**  
10 ml dvakrát denně.

### **Děti do 2 let věku:**

U dětí do dvou let věku se tento přípravek nesmí používat.

Pro přesné dávkování použijte přiloženou odměrku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater: Doporučit dávkování není možné vzhledem k nedostatku údajů (viz také “Upozornění a opatření”).

Mucoplant proti kašli s břečťanem se užívá neředitelný bez ohledu na jídlo.

Při užívání přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem se doporučuje v průběhu dne pít hodně vody nebo teplých nápojů bez kofeinu.

Pokud příznaky přetrvávají déle než jeden týden v průběhu užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se účinek přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem zdá příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

**Jestliže jste užil(a) více přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem, než jste měl(a)**

Neužívejte větší dávky, než je doporučeno. Užívání ve větších dávkách, než je doporučeno (více než trojnásobek jednorázové dávky) může způsobit pocit na zvracení, zvracení, průjem a neklid. Prosím, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne o nezbytné léčbě.

Byl hlášen jeden případ 4letého dítěte, u něhož se po náhodném požití břečťanového extraktu odpovídajícího 1,8 g rostlinné látky (odpovídající 195 ml přípravku Mucoplant proti kašli s břečťanem) projevila agresivita a průjem.

**Jestliže jste zapomněl(a) užít Mucoplant proti kašli s břečťanem**

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

**Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.**

#### **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny gastrointestinální nežádoucí účinky (pocit na zvracení, zvracení, průjem). Četnost výskytu není známa.

Byly hlášeny alergické reakce projevující se jako kopřivka (urtikarie), kožní vyrážka, dýchací potíže (dyspnoe) a anafylaktická reakce (závažná alergická reakce). Četnost výskytu není známa.

Dojde-li k alergické reakci, přestaňte léčivý přípravek užívat a neprodleně se poraďte se svým lékařem.

**Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## 5. Jak Mucoplant proti kašli s břečťanem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Léčivý přípravek lze používat po dobu 6 týdnů od otevření lahvičky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

## 6. Obsah balení a další informace

### Co Mucoplant proti kašli s břečťanem obsahuje

- Léčivou látkou je suchý extrakt z břečťanového listu. Jeden ml obsahuje 1,54 mg extraktu (ve formě suchého extraktu) z Hedera helix L. folium (břečťanový list) (DER 4-8:1). Extrakční rozpouštědlo: ethanol 30% (m/m).
- Dalšími složkami jsou: kalium-sorbát; hyetelosa; aroma černého rybízu SD (652281); roztok maltitolu (E 965); kyselina citronová; čištěná voda.

### Jak Mucoplant proti kašli s břečťanem vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Mucoplant proti kašli s břečťanem je hnědavě žlutý, mírně zakalený sirup s charakteristickým pachem (rybíz).

Mucoplant proti kašli s břečťanem je k dispozici v balení s obsahem 100 ml, 200 ml, 250 ml sirupu v lahvičce z hnědého skla s přiloženou odměrkou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

### Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. Theiss Naturwaren GmbH  
Michelinstraße 10  
66424 Homburg  
Německo

### Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

**Bulharsko** Мукоплант експекторант с бръшлян 154 mg/100 ml, сироп

**Česká republika** Mucoplant proti kašli s břečťanem

**Chorvatsko** Mucoplant sirup od bršljana

**Itálie** Edera Dr. Theiss

**Maďarsko** Mucoplant Dr. Theiss Borostyán köhögés elleni szirup

**Německo** Mucoplant Hustensaft Efeu

**Litva** Helixicum sirupas

**Lotyšsko** Dr. Theiss efejas sīrups

**Polsko** Mucoplant na kaszel bluszcz

**Rakousko** Mucoplant Hustensaft Efeu Sirup

**Rumunsko** Mucoplant iederă 1,54 mg/ml sirop

**Slovenská republika** Mucoplant sirup proti kašľu s brečtanom

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5. 11. 2020.**